

洞  
天  
奧  
旨

洞 吳卡

醫不窮理不可談醫藥不執方不可用藥以醫藥之難精也鐸性青刀圭然而獲效者半每致晚於名師也康熙丁卯秋遇

岐伯天師於燕市譚醫者五閱月凡臟腑經絡陰陽色脈氣血順逆邪正虛實寒熱異同罔不盡言無

隱且通傳方術試之多奇驗鐸信  
師之深退而著述以素問靈樞  
若心氣新編等辨證錄俱已告竣  
計八千餘有奇亦可謂書之富矣  
癸亥冬再遊燕市所遇者皆瘡瘍  
壞症鐸執方療之病家懷物棄而  
不用反信任世醫刀鍼割裂反出非  
害

細經劑救援卒至死

不悟鐸痛恨久之因再著茲編名曰洞  
天奧旨洪醫用藥無此本諸洞天之  
傳也又慮證多方累附祖父家傳  
採古今驗方列於後無謬不備學方  
不神摠示忍受千百世人因瘡瘍而  
夭喪也或曰子著述甚富而靈素亦書  
窮理甚晰今又傳外科毋乃太多難  
執乎鐸謝之曰靈素之誤瘍瘡僅

論營氣未調耳未嘗遍傳方法  
也且瘡病之論能一二言可罄其端  
實多至變異而其禍實大病  
已成之後藥之必非輕小劑之藥也  
若已成而後治之必能回循常法可治  
也今世治瘡瘍者不始息養癰必鹵  
莽嘗試害相等也而其咎皆本步  
石學然而學亦非易天下讀外科

者其也往用之敗績因傳書術之  
未可師也鐸之書術傳諸國天之  
師其理淵微其方秘奧即間採  
家傳舊傳之方日試百驗可信可師  
傳之千百世而無悞者也藥又曰古人治  
瘡瘍者多用刀鍼成名者子孫傳  
窮理藥善執方何獨刀鍼累之者  
恐子有師而望師也嗟矣鐸豈望

師者哉瘡瘍之病刀鍼者古人不  
得而用之蓋瘡瘍宜急治而不可  
少緩宜重治而不可過輕治之早  
且重則毒且盡散毒散則肌肉頓  
生何憂尚刀鍼乎凡用刀鍼者以救  
敗之法也天師所最忌故方中無  
傳鍼誠恐未備採前代名醫用力  
鍼之法今之以佐諸方之不逮也

割肉損皮無神方以輔之未有不  
顛覆者也。是乃職可以救敗而不可  
以成功。何者專用驗方轉敗尤速而  
取勝更神。萬無一失之為伯乎。然  
則鐸之窮理執方乃善于得師  
也。書成因并之。首。

山陰陳士鐸字敬之號遠公別  
號朱華子題于燕市時



陳序四

康熙甲戌仲冬 望後三日也

洞天奧旨序

人身不天地而莫不絪之絪而知  
之絪絪矣夫風日晴和雨暘時家寒  
暑得宜乃安安不忤天之常也日月  
薄蝕雷電晦冥霜害稼旱澇  
頻仍春夏雨行秋失之令天之害也  
地之害也五穀盡稼虐物者以

隆序一

川溼不見堤唯永固長星之地之爰  
則山崩以竭海佛陸沈耒苗枯槁  
瘡痍流口舌是也然則天地之於  
我人孰能知之知之者豈惟聖人參  
合身不具示天地常公耳聰目明  
手持足履飲食起居不榮於人卑  
仰視息之無有疾痛之累安焉

肉而氣血一以運臟腑壅滯百病叢生  
五氣為物外而癰疽瘰癧毒輕重不  
齊血氣腐潤寒熱交通見人身之  
常變与天地之常變等而求其起死  
回生轉敗為功必進自回天之手固非  
庸常之術所能也第內科目素向  
難經靈樞而卒歷代亦以著書者

專在血車二不問有實見一班而心之  
驚名逐利長放野馬功牙已不效輒  
委之于市良足深恨也至如外科其業  
原亦及內科之什一處也乃以內科多  
涉而考之于外科業則外科長以為不  
關臟腑而為些微視其脈之虛實寒  
熱以症之陰陽而輒墮用刀鍼妄施

敗毒攻伐之劑致傷弱出輕變居重  
重害至危而不可收拾乃至死伊  
誰之咎与更有肝陰受邪之徒妄  
心不良意機射利奔屬輕症而故作  
危言以惑病者勒券索謝終後用  
劣藥殊不知疽毒之無以復生不測幸免  
高年而延誤遲誤至不能施其伎倆

枉是姜之病原深重以却其罪此等之  
受天譴鬼責吾知必不能免也特出先  
聖先賢其書之使以垂勸戒之必為  
古者真位以仙果其在天際俯視  
下土養生之曰罹災甚患而莫之拯  
溺寧不隱惻于表而歟現身說法  
以度世者乎哉

去友陳處以先生至誠惺惺若無憾焉  
心讀書授意不得行其志而若遊於市  
旅舍淒其甚逆莫逢村肩輿嘆有同  
第人憐其抑鬱笑寥窅初其行止知  
至異鄉首覬望以為嘆身計在日時  
際艱難冒家以去囊之術問世乎遠  
致謝不取謂同所願也願乎師指



降序匹

接恐不能自信如能人之性亦如吾誠  
中人而不我信也人日子為有求吾為  
不新所以慢于是相與共數晨夕古古  
夫由講求討論是修與秘悟當別  
主婦以女姓氏百五黃帝師政但必  
百五得武時張仲景也陳天為  
將下好殊悔詢向之晚而公踪莫可

授吳蓋象師

市里法有仙真象人洞通市塵共  
玄原對度人而人皆可度人亦莫之復陳  
君風松深厚道氣淵源故得與仙靈  
相遇耳提面命得為千古音孫是  
正聖高真彰托以援救世人之凶厄  
故不憚涸跡市塵而現身佐世

陸序王

達第可及甚書錄之仙真口授之秘  
已得八千餘紙業已付梓以都門美  
品更憫外科之昭誤予患其實以步  
解特甚同天與有公之仙秘密  
真傳迥異於時醫之治法長夫癰疽  
之患雖在膏肉之間然莫不由臟腑不  
和受病予而能知此者余直曰庶幾

此或收補並施或純用補劑置刀鍼  
而不用藥之狂寇竊昔踞陰負隅皆  
由機寒所迫亦有苦良被脅者是猶  
癰疽之氣血內壅所致也必攻破其  
寨柵毒搗其巢穴既已殲厥渠魁脅  
從即宜周旋善必盡除其根孽寧保  
至玉石俱焚之弊寇雖蕩平而地方

陰序六

苦醢類矣是猶癰疽既潰而後攻  
火煔毒必至元氣類敗而身命与之俱  
歿矣必屬陰症皆由臟腑內遺九死  
之生急宜大補真之虛而速救于垂  
危破之之黃河天塹已漏唯當填築  
補塞庶保無虞傳安施秋鍾則云  
見朋快笑至證用力鍼即如也冠初聚

上良司能調陣布兵而慰撫之何難  
使快解散地方仍歸安靖各經動員  
兵則必挺而走險招集游蕩更依附  
強寇而成大敵以善良受蹂躪之害矣  
是癰疽初發本所消乃似刀鍼  
傷其筋絡肌理致將肉骨成潰腐為  
力不能以多著補救久而不能收口至

冠羸而或壞症此也遠公乃夙之  
師故得遇仙真指點而足傳與誠  
相人之嘆後乃世之航也余垂髫  
慕之千里從師身執洒掃之事以  
出山招剎震叩位局特以茲歸之望  
子心切後涉世緣不字濫叨仕以藉遂  
失故吾姓夢寐依之德不忘慕之追

明之志矣。今之樂。亦重仙真。莫過若於  
陳君者。不勝扼腕感慨。而健羨其也。  
因茲為之序時。

庚子戊寅菊月穀旦

賜進士出身文林郎廣西道  
監察御史奉直魯弗陶式  
玉衡子好讓



洞天奧旨跋

曾祖遠公自少習舉業以數竒屢試輒蹙  
已而出遊京師復不得志遂究心於醫學  
焉一日夜深獨坐忽有二老者扣扉而進  
衣冠整肅所與談皆青囊之術情意真切  
指示詳明盤桓兩月餘臨別時謂公曰子

可出而救世矣言訖不見公始識其爲仙  
子也由是閉戶著書闡發醫理二十餘種  
所著素靈本草傷寒六氣外經微言石室  
秘錄辨證錄臟腑精鑒脈訣闡微辨症玉  
函等書付梓行世已歷有年所矣第前所  
刊者俱係內科而外科不與焉不知瘡瘍

之症其險更甚於內科嘗見世之患瘡瘍而不救者何可勝數要其所以不救之故皆由於症候不明治之不得其法耳今本集所載其辨症也脩而晰其用法也妙而神毋論奇名恠症處萬死一生之候按法治之無不可轉死爲生屢試屢驗誠爲有

濟於民生有功於後世矣故特付諸剞劂  
以公海內庶二仙秘術得以不朽而先大  
人著書苦心亦不虛歟

嘗

乾隆庚戌花朝曾孫

鳳輝謹跋

洞天奧旨

凡例

一鐸遇天師岐伯首講靈素二書俱載有癰疽之篇論之甚詳鐸憫近今人患瘡瘍者衆加意訖質天師娓娓言之鐸記憶不敢忘今彙成全書云

一天師傳方甚富試之罔不奇效鐸不敢秘盡傳無隱以廣師仁

一先大父安期公生平頗好方術遊蜀遇峨嵋山羽士傳有秘方效驗如響亦登此編

一外科諸家皆執方治病經絡未明陰陽未識往往貽誤變出非常是編辨晰甚精凡我同人幸細覽用藥庶不致再錯也

一鐸著辨證奇聞曾將各瘡癰施治成效先論列問世然畧而不詳不若茲編之脩也

一鐸自遇聖師已歷年所所著醫書約八千餘紙頗倦命筆伏思聖師傳我異術秘而失宣難逃罪譴

而救濟心懷故振興情氣再肆文瀾續成茲編云

一外科方刻諸書襍而不純鐸採其論之至正方之最

驗者各附于

天師傳方之後以脩臨症之採擇也

一外科專尚刀鍼用之常則免養癰潰敗之害然天  
師惟主內消不喜外刺故編中方法內消居多實遵  
師訓非怯用利器也

一外科灸法素稱神奇然自頸以上萬不可輕灸灸之  
多致死亡願我全人各宜遵守勿謂艾炷細小即可  
灸也

一瘡瘍成于火毒自宜用攻瀉之藥然而一味攻瀉則  
氣血大傷未潰者火毒難于消化已潰者肌肉艱于

斂收必用補爲主而佐之攻瀉之味則轉易奏功故  
天師所傳之方補多于攻卽鄙人所採之方亦攻輕  
于補云

一外科瘡瘍貴在急治蓋正氣未傷邪氣易散天師  
與諸真所傳皆急治良方也萬勿因循畏怯反致敗  
壞

一瘡瘍外發皆由臟腑內虛也故各門經絡脩載無遺  
亦使人察外知內也

一癰疽疔毒非疥癬可比世人於初起之時慢不經心



往往變出非常甚可畏也故無論小瘡細癰俱當慎重治之

一陰癰陰疽多生于驕恣鬱怒之人或縱酒貪花之子與頻服熱藥燔灸之客故治法必須大劑化毒細小湯丸不中病情醫家病家各宜知之

一外科治病貴識陰陽陰陽既明則變陰變陽之異何難辨別故篇中各論辨陰陽頗精勿謂其言之太激也

一天師惡用刀鍼然瘡勢大橫潰爛瘀肉不急用刀

鍼刺割則惡毒衝潰又反害肌肉恐成敗壞鋒採前  
賢善用刀鍼良法附諸篇後佐 天師之未逮也非  
過街奇

大雅堂主人遠公識

洞天奧旨目錄

卷一 首載經絡圖穴

瘡瘍標本論

瘡瘍辨脈論

瘡瘍陰陽論

瘡瘍善惡論

瘡瘍經絡論

瘡瘍內外論

瘡瘍火毒論

瘡瘍腫潰虛實論

瘡瘍順逆論

卷二

瘡瘍生死論

瘡瘍嘔吐論

瘡瘍口渴論

瘡瘍秘結論

瘡瘍痛癢癰木論

瘡瘍寒熱論

瘡瘍辨膿血論

瘡瘍險地論

瘡瘍死肉論

卷三

瘡瘍生子宮貴論

疔瘡形症論

瘡瘍陰陽真假論

妊娠瘡瘍論

瘡瘍肥瘦人不同論

瘡瘍隨證用藥論

瘡瘍開任論

瘡瘍火炎論

瘡瘍刀鍼論

卷四

瘡瘍敷藥論

瘡瘍治法論

瘡瘍調護論

舍癰從症論

舍脈從癰論

舍時從癰論

瘡瘍用金銀花論

瘡瘍不可委鬼神論

產婦生瘡瘍宜用補陰論

瘡瘍不必隨經絡用藥論

卷五

背發

泥丸發

腦後發

耳後耳下發

耳前發

鬢發

臉發

對口發

目銳眦下發

頤發

唇發

肩膊發

腎俞發

腰下發

卷六

胸乳上發

胸發

額發

兩脇雙發

流注發

環項發

腎陰發

對臍發

尻發

手背發  
附手心發

足背發  
附足跟疔

肺癰肺痿

腸癰

鬻癰

卷七

骨癰

腰癰

臂癰

膝癰

腋癰 附馬刀挾瘻

乳癰

箕門癰

眉癰

蠹疽

手足指瘡 附脫疽

筋疽勞疽齒疽

中庭疽井疽

合陽疽

卷八

疔瘡

骨痰瘡

骨毒帶瘡

骨痿瘡

陳疔瘡

赤炎瘡



血亂瘡

天炮瘡

療癰瘡

內外臍瘡

人面瘡

血風瘡

卷九

杖瘡

禿瘡

魚臍瘡

陰包毒瘡

燕窩瘡羊鬚瘡

胎毒瘡繼眉瘡

肺風瘡鰓鼻瘡

粉花瘡裙邊瘡

臟毒痔漏瘡

陰囊漏水瘡胞漏瘡

雌雄狐刺瘡

水流麻根瘡

肥粘瘡

干口瘡

時毒暑癰

齒齦

白殼瘡

卷十

鼻癰鼻痔

嵌指

鵝掌風

疥瘡  
附膿窠瘡

坐板瘡

喉閉雙蛾瘡

大疔瘋

蛇窠瘡

蜘蛛瘡

陰陽濕痰瘡

附脫胎

楊梅疔瘡

楊梅圈瘡

楊梅結毒

翻花楊梅瘡

陰陽楊梅瘡

楊梅癰瘡

楊梅痘子

齒窟瘡

胎毒皮瘡

卷十一

風熱瘡

黃水瘡

傷守瘡

手足了毒瘡

胎毒瘡

濕毒瘡

火丹瘡

附赤白遊風

內丹

飛灶丹

吉灶丹

鬼火丹

天火丹

天灶丹

水激丹

胡次丹

野火丹

烟火丹

胡漏丹

粉癭瘡

筋癭骨癭石癭

氣癭

血癭贅

肉瘤贅

卷十二

走馬牙疳

口疳

鼻疳

喉疳

月蝕疳

鏃指疳

袖手疳

膜疳

陰疳

妬精疳

無辜疳傷疳

淫尻疳

落臍疳

臍漏疳

金刃瘡

附自刎

火燒瘡

湯盪瘡

含腮瘡

皴裂瘡

漆瘡

凍瘡

箭毒瘡

卷十三

跌打損傷瘡

附破傷風

日曬瘡

虎咬瘡

犬咬瘡

鼠咬瘡

馬汗瘡

火斑瘡

灸火瘡

日漸瘡

獨骨瘡

竹木發破傷水瘡

蛇咬瘡

蜈蚣叮瘡

蝎傷瘡

蜂咬瘡

刺蟲傷瘡

蠅蝮尿瘡

人咬傷瘡

砒霜藥瘡

水漬手足爛瘡

偷針眼瘡

眼丹胞

手足麻裂瘡

卷十四

奇方上

救命丹

治癰疽各瘡  
陰症陽症

金銀補益湯

治瘡瘍元氣虛  
倦口乾發熱

人參敗毒散

治諸瘡瘍效驗如神  
拘急痲痺神效有力者

極驗溶膠湯

治諸瘡瘍惡毒未愈保命  
功活人最多不可輕忽

加味十宣散

治瘡瘍因外感風寒內  
因氣血虛損經絡不通  
寒虛而入是宜此散

花藤薜荔湯

治發背諸瘡癰初起

消散湯

治瘡瘍初起至時消散

柞木飲子

治瘡瘍未成自消已潰自乾  
小証候可以倚伏

廻磨金銀花散

治瘡瘍痛甚  
色變紫黑

神效托裏散

治瘡瘍腫毒發背腸癰乳癰  
瘡毒神效壯熱不論平白虛  
實俱效

神散湯

治瘡瘍初起

金銀花酒

治一切惡瘡癰疽不問新舊生何處  
或解瘡腸癰初起便服之毒散

黃金飲

治瘡生腿附骨癰

金銀五香湯

治諸瘡一二日愈平熱服之  
咽喉閉

英花湯

治瘡癰未潰

金銀解毒湯

治瘡癰腫膿腫作痛煩躁  
發熱大發口舌生瘡瘡毒  
發紅

金銀六君湯

治瘡瘍作嘔不思飲食而  
嘔則腹中收攣急大便溏

消毒神聖丹

治背癰或胸腹頭面手足之瘡  
五日内服即散



散寒救陰至聖丹

治癰疽疔毒  
黑暗諸現因象

立消湯

一切癰疽陰毒陽毒無論生在何處  
未潰即消

通氣散

治癰疽背流注折傷腫敗  
壞瘡疔毒死肌脫患于氣滯者  
板根于氣滯

內疎黃連湯

治嘔吐逆發熱而煩脈沉  
而實腫破瘡癰

內外復煎散

治腫癰于外排盤不深  
形症在表

當歸黃芪湯

治瘡瘍臟腑已行而痛不  
可忍

八仙散

治一切惡瘡初覺時  
連進三服必失

中和湯

治瘡瘍半陰半陽似清非清似腫  
非腫以固元氣虛弱失于補托所致

托裏散

治一切惡瘡發背疔瘡便毒  
瘰癧結毒流注腫甚作膿者此  
實熱以清之症故可下之

回毒金銀花湯

治瘡瘍色變紫黑

護膜蠟丸

瘰癧防毒內攻未破即消  
已破即合一日之中服之  
每有經驗

托裏黃芪湯

治瘡瘍潰後膿多肉虛

托裏溫中湯

治瘡瘍寒食內傷膿出  
清稀大痛下痢  
腸鳴腹瀉大便微瀉

托裏神奇散

治諸瘡發背疔瘡

黃芪六一湯

治癰疽潰後作渴及人換  
故作治肺脈洪數者  
瘰癧服此降之

參花湯

治潰瘍氣血俱虛發熱惡寒  
失血等症

獨參湯

治瘡潰瘍潰後氣血虛極  
令人發熱惡寒失血之症

加減八味丸

治瘡瘍瘰癧未瘥腎水虧  
損不能上潤合心火衰小便頻  
數白濁陰痿飲食肌消損

加味聖愈湯

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

十味托裏散

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

內托散

半從治各瘡腫毒

止癩當歸湯

治背癢癩瘡等症

補中益氣湯

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

十全大補湯

治虛弱者或虛者氣虛者

八珍湯

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

人參養榮湯

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

加味養榮湯

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

治魂丹

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

內消神丹

治各處惡瘡

梅花點舌丹

治一切各處腫毒等症

飛龍奪命丹

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

奪命丹

半從

內造蟾酥丸

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

中和膏

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

廻陽玉龍膏

治瘡瘍膿血過多或金刀瘡血出多而面色不鮮心跳

洪寶膏

治諸般瘡癰等症十分熱者用此膏若過陰症陰瘡不可用也

搗毒散

治諸瘡毒 疥癩

水澄膏

治腫毒敷之

鐵井欄

敷藥

清涼膏

治初起癰腫瘡毒熱熾大痛敷者

千金方

治石瘻堅硬不作瘻者

烏龍掃毒膏

治一切瘰癧瘡毒腫毒已潰未消並皆治之此方最奇

香蟾膏

治背脊疔毒

烏龍膏

治陰疽背脊疔毒四不知痛者此膏敷用

東離散

治惡疽疔腫無名惡毒

收毒散

治瘰癧背脊兩頭開發不住勢在危急即以此藥貼之甚效

卷十五

奇方巾

寶鍼散

治瘰癧有頭不破及疔腫時毒或生四肢其勢微緩誤針者

代針散

可不用針自破此散服者

替鍼散

治瘰癧已潰未破或破後膿出不快者

鍼頭散

治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘰癧口本合此膏敷之

碧落神膏

治各瘍瘰癧疔瘡腫毒神效

吸毒仙膏

治諸般瘰癧已破貼之最效

神膏方 專貼發背諸瘡瘍

陽疽末藥方

陰疽末藥方 治各瘡疽癰毒

定痛淨膿生肌膏 治各瘡疽癰毒

陰陽至聖膏 治陰陽瘡疽用口去其口邊腐肉貼之止痛生肌

末藥方 此方有膏者其用神奇無比

生肌散 治諸瘡生肌

生肌散

補爛丹 此方抄選定乾用猪油調敷

生肌散 治瘡口不合

仙方救命湯 治疔瘡走了黃打滾將死服見火光危症

紫菊湯 治疔瘡腫毒

花丁散 治疔瘡毒氣

神效桔梗湯 治咳嗽胸膈陰痛內熱腫痛咽乾口燥煩渴多渴肺癰特出

扶桑清肺丹 治貪淫生肺癰已成

起痰延生丹 治肺癰損傷其痰氣促

千金煮肺湯 治肺痿咳嗽吐血有汗嘔吐大小便不利等症

犀歸湯 治腸癰腹內隱痛大小便秘

兩間湯 治大腸癰

王公湯 治小腸癰

龍葱散 治乳吹

救乳化毒湯 治乳癰乳吹初起神效

英藤湯 治乳癰初起

參芪瓜葉散 治乳癰乳吹已成化膿者水煎服即消如癰毒更效

伯高太師方 治乳癰初起

末類方 治乳癰初腫

葛真君湯 治癰瘰

夏枯草膏 治癰瘰馬刀不洵已潰未潰或日久成漏

昆花湯 治項下腫核卒難收口戒慎忌口常服尤驗

文武膏 治癰瘰神效

蝸牛散 治癰瘰潰而未潰

夏枯草湯 治癰瘰馬刀不洵已潰未潰成漏或飲食不甘寒熱均瘰癧或癰瘰神效

癰瘰神膏 治各種癰瘰

神祕湯 治癰瘰

木通湯 治癰瘰

敗毒散癰瘰湯 治四種癰瘰

膏藥方

治癰癤不破者

通治癰癤方

不分虛實新久表裏及諸  
瘰癧結交效

癰癤酒藥方

治癰癤結核中生滿  
頭頑硬不穿者甚效

擡頭草膏

治癰已破者

六神全蝎丸

治多年癰癤百治百愈  
服此膏七日全愈

黃白殭蠶散

治癰癤瘡久不收口

廉瘡膏藥方

治癰瘡內外

杏霜丹

治癰瘡經年累月不愈者

欽瘡丹

治癰瘡不斂

化癰仙丹

治濕熱變化癰風即大瘰也

三白膏

治內外癰瘡

紅潮散

治濕毒癰瘡

止癢散

治蟲癢癰瘡

隔紙膏

治久遠癰瘡頑瘡難去

潮腦膏

治血風瘡一宿見效三月全好

貝母散

治活人面瘡

雄黃散

治先癰有虫作瘡痛者神

戊油膏

治多年不好先瘡如神

三黃膏

治疥癩神效

衛心仙丹

治受屈棒患血毒

白蠟膏

專貼杖瘡神效

活血紅花湯

棒瘡其藥

又蓋體湯

治杖瘡神效

護心仙丹

外治作膏貼之

膠粉散

治遊窩瘡

膠粉散

治羊鬍子瘡

又方

鬼代丹

半繩注打着不痛

冰硫散

治鉅和風

膠香散

治胎毒瘡

草牛散

治癰頭胎毒

膠髓膏

治患眉瘡

臘脂膏

治肺風瘡

杏黃散

治赤鼻酒皸粉疵

二粉散

治婦女面生粉花瘡

裙邊磨方

大風膏

治裙邊瘡一名褲口風瘡

痔漏驗方

治痔漏多年不愈及痔漏  
脹服風下血者皆驗

世傳方

治痔漏

護漏湯

治痔漏生管用此膏餘用  
即退管生肌矣

補漏丹

治痔漏

青苔散

治濕熱成痔作漏

全生丸

治多年痔漏如神

洗痔方

即太倉公方洗七日全愈陰囊濕  
與腿濕此方洗之俱效

無花湯

洗痔效

乳香膏

專貼痔漏如神

南陽張真人方

治痔漏

護痔散

護痔外好肉

槐角丸

治痔漏下血

槐萸散

治腸風痔漏下血有驗

水沉膏

治痔毒暑痛

藥線方

治齒齦如神

癖方

頑癖方

即張真君傳



牛皮癬方 即天師傳方

叱僧散 治汗斑如神

丁香散 治臭癰神驗

化癰丹 治臭癰臭痔

粉香生肌散 治跌指甲傷

槐花湯 治驚掌風

叉方

硫糕丸 治濃窠疥瘡甚效食後調湯送下五六十丸

洗疥方

歸防湯 治表消疥瘡煎百神效

蒼水磨 治小兒黃水瘡濕結于皮上也

卷十六 奇方下

雄黃燈 治坐板瘡

莧蘿散 治坐板瘡甚驗

叉方

坐板瘡方

大麻瘋方

白鹿洞方

治麻風眉毛脫落手足拳攣法  
漬爛唇翻眼綻口歪身麻

秘傳漆黃蟾酥丹

治大麻風瘡

洗大風方

生眉散

治大風生眉毛

片根散

治喉閉乳蛾

太倉公蜂房散

治喉痺腫痛

倉公壁錢散

治喉生乳蛾

救喉湯

治双蛾喉大作痛口渴求水下  
喉少快乃纏喉風也

啓關散

吹喉首先服救喉湯再用啓關散吹

化癰神丹

治喉生癰瘡先發後痛  
久不愈者

倉公喉癰方

潤喉湯

蛇頭瘡方

即高太師傳方治癰生天蛇頭

雄黃解毒散

治天蛇毒疔初起紅腫  
熱疼痛至心

解蛇油

治蛇窠瘡生于皮毛作痛  
並治諸惡瘡

治蜘蛛瘡

楊梅瘋毒丸

劉氏經驗方

治楊梅毒瘡

楊梅瘡洗法

全陽方

治首陰爛落

土茯苓湯

治楊梅結毒林中丞傳

末藥方

楊梅瘡方

風藤散

治結毒

結毒方

治結毒鼻柱將落主可全之

不疼點藥

治楊梅疳瘡方

黃床散

治腎臟風瘡不可當

五根湯

疳瘡摻方

即張真君方

疳瘡方

即秦真方

玉莖爛方

即伯高祖師方

勝金散

治下疳潰爛疼痛

齒齕瘡方

治齒齕有傷風瘡作痛

玉粉散

治胎毒涌皮瘡

雜與湯 治楊梅毒瘡

劉寄奴散 治便毒

又方 治便毒初起

消毒散 治便毒初起三四日可消

化魚湯 治結成便毒魚口

化毒救生丹 治頭面無故生瘡第一口頭面重如出茅口即用此方可救

蝸膏水 治頭上生瘡作癩或胎毒成癩頭

黃水瘡方 又方

栢葉散 治三焦火盛致生火丹作瘡或作痛延及遍身

枯癰方 治癰初起成形未破者及根蒂小而散者

秘傳欬瘤膏

陰尸疳方 治陰尸作瘡作痛生瘡生虫

護陰丹 治陰外中生瘡

止癢殺蟲湯 治婦人陰中生瘡長蟲痛癢難受

完體續命湯 救雙傷而氣未絕或成癰疽或成肉綻而腸已出或黃頭入肉或刀傷月枯等症

補血救亡湯 救救傷危亡諸症

芫膏散 治急方治刀斧傷損

治刀傷損骨止有皮連者

金刀傷方

又方

金瘡方

又傳方

治金瘡出血又可治脚縫出水

汞類鈴方

治金瘡出血不止

火燒瘡方

蚌津方

治湯泡火燒甚效

湯火方

湯火傷方

凍瘡方

又方

箭鏃瘡方

治毒箭及箭鏃入骨不能得取出即不可拔動恐其骨傷

又方

張真君六神散

治折傷最驗

骨傷折痛方

跌仆瘀血痛方

定痛散

治跌打損傷骨折疼痛等症

跌傷方

岐天師全體神膏

治接骨神效

止血散

刀瘡口裂血出不止用此撒之血即止

逐瘀至神丹

治跌仆傷受用

接骨至神丹

治接骨神

治破傷風方

倉公治破傷風方

榆根散

治虎咬傷血去潰爛疼痛

班猫散

治風犬咬神

青苔散

治天咬

治鼠咬瘡方

麝香錠子

治毛蟲咬

中蜘蛛毒咬瘡方

誤吞麥芒鯁喉瘡方

誤吞針鈎有線者

治面上惡瘡五色方

治蚯蚓毒

經驗

治諸瘡肉如蛇出數寸

治纏脚生瘡

普濟方 治一切疥瘡

談楚翁試驗方

治婦人面生粉刺瘡

馬咬瘡方

千金方

治毒攻手足腫痛欲斃

聖惠方

治頭風白屑

肘後方

治惡瘡痂後癢痛

掃癩丹

治惡瘡似癩十年不愈者

摘玄方

治唇裂生瘡

鵝掌油

治脚縫爛瘡

魚脂膏

治白駝

又方

豈根散

治癰瘡

半夏散

治一切瘡

綠雲散

治灸瘡止痛

去苦散

治蛇傷解蟲毒神效

輕粉散

治豚瘡痛癢流水流血

勸醫

後跋

# 手太陰肺經







# 手陽明大腸經



# 足陽明胃經



# 足太陰脾經



# 手少陰心經



# 手太陽小腸經



# 足少陰腎經



# 足太陽膀胱經

清之具

匹

大雅堂

天柱

通天

絡部

主枕

大邪

風門

厥陰俞

心俞

隔俞

肝俞

膽俞

脾俞

胃俞

三焦俞

膀胱

大腸俞

小腸俞

膀胱俞

中膈俞

承扶

白環俞

會陽

殷門

合陽

委中

申脉

金門

崑崙

至陰

通谷

束骨

京骨

足陽

承筋

承山

飛揚

委陽

附陽

承筋

承山


飛揚

委陽

附陽

承筋

承山



承光

處

世差

明

神堂

諱

南

鬼門

陽

育門

志室

白

秩邊

浮郄

委陽

附陽

胃倉

手厥陰心包絡經







# 手少陽三焦經




# 足少陽膽經



# 足厥陰肝經



# 經




同天經

一

一

# 任脉經



洞天奧旨卷之一

山陰陳士鐸敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳

會稽陶式玉尚白甫號存齋評

玄孫增方溯回氏校

瘡瘍標本論

凡病皆有標本之異而瘡瘍亦宜知之苟不知標本輕妄施藥不中病情往往生變是標本不可不辨也二者之中本重于標知本而標無難治也世人皆謂瘡瘍生于肌膚何必問其臟腑誰知外生瘡瘍皆臟腑內毒蘊結于中而

發越于外也苟不治內而惟事外攻則內毒未散外毒安能化乎故必先看其生瘡于何處係何經部位如生在頭額則是太陽之病生在脇肋則是厥陰之疾所謂本也次察其痛癢痛則陽症癢則陰疴所謂標也標本分明自然用藥無悞生在陽經而作痛此純病于陽也內外俱用瀉味自易成功倘生于陽而作癢此陽虛而病陰也補陰以化毒而不可損陽以耗氣也生在陰經而作癢此純病于陰也內外俱用補劑無難奏効倘生于陰而作痛此陰虛而病陽也補陽以化毒而不可損陰以虧血也蓋耗陽之

氣虧陰之血俱能損傷營氣夫營氣最忌損傷瘡瘍之生  
原因營氣之逆也營氣之逆者又因于胃氣之逆也人生  
以胃氣爲本烏可使之逆乎胃氣逆于前而經絡不通臟  
腑壅塞以致結成癰疽倘再逆于後又何以化毒哉是胃  
氣之斷不可逆也而胃氣之所以逆者何故乎損之甚者  
逆之甚傷之至者逆之至也故治瘡瘍者總以顧胃氣爲  
主有胃氣則本病陰而能生無胃氣則標病陽而亦死治  
瘡瘍者辨明標本而加意于胃氣何患術之不神哉

薛新甫曰若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣



虛者先治其本若病急而元氣又虛者必先治本而兼以治標大約癰高焮痛膿水稠粘元氣未損也治之則易潰癰微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不癰不痛或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之尤難者也愚意薛氏所言元氣者卽胃氣也

### 瘡瘍辨脈論

診脈所以治內病也若瘡瘍則辨症而不必辨脈以瘡瘍之病在外也雖然有諸中必現于外安在診其裡不可以知其表哉況瘡瘍之毒皆出諸臟腑乎既是臟腑內病烏

可徒辨症而不辨脈乎惟是瘡瘍之變症多端而瘡瘍之變脈亦不一狀吾又何能盡示之乎然不可盡示之中而實有簡要之法在大約瘡瘍未潰之先脈欲其有餘而瘡瘍已潰之後脈欲其不足有餘者火毒旺也不足者正氣虛也未潰而現有餘之脈乃宜盛而盛順之象也已潰而現不足之脈乃宜虛而虛亦順之象也倘已潰而現有餘不宜盛而盛也未潰而現不足不宜衰而衰也不宜盛而盛乃火毒之大熾不宜衰而衰乃火毒之甚深皆逆之象也順吉而逆凶又何疑哉而有餘不足之脈何分順逆乎

夫浮也乳也滑也實也弦緊也洪長也大散數也皆有餘之脈微也沉也緩也濡遲也伏軟也弱結細也皆不足之脈也有餘之脈宜現于未潰之先而不宜現于已潰之後不足之脈宜現于已潰之後而不宜現于未潰之先治之法未潰而現不足宜補陽以發其毒而人參黃芪不可緩用也已潰而現有餘宜補陰以化其毒而熟地當歸所當亟投也更有秘訣者毋論有餘不足各脈倘無斷續之形皆可用大補之味而佐之消毒之品同羣共用亦能轉危爲安反敗爲利永可以脈之不順卽棄之而不治也

瘡瘍陰陽論

瘡瘍最要分別陰陽陰陽不分動手卽錯或謂陰陽者分于氣血也不知氣血亦分陰陽之一端而不可執之以槩定陰陽也蓋瘡瘍有陰症有陽症有陰熱陰寒有陽熱陽寒有陰滯陽滯有陰陷陽陷有先陰變陽有先陽變陰名各不同也病不同而何以辨之陽症必熱陰症必寒陽症必實陰症必虛陽症之形必高突而腫起陰症之形必低平而陷下陽症之色必純紅陰症之色必帶黑陽症之初起必疼陰症之初起必癢陽症之潰爛必多其膿陰症之

潰爛必多其血陽症之收口身必輕爽陰症之收口身必沉重陰熱者夜重而日輕陽熱者夜輕而晝重陰寒者飲溫湯而作嘔陽寒者飲冷水而欲吐陰滯者色紫黑而不變也陽滯者色微紅而不化也陰陷者色黧黑而不起也陽陷者色紅黃而不起也先陽變陰者始突而不平初害痛而後害癢也先陰後陽者初平而潰始患熱而後惡寒也陽中之陰者似熱而非熱雖腫實虛若黑而非澹欲痛而無膿既浮而復消外盛而內腐也陰中之陽者似冷而非冷雖虛而氣腫雖淡而似赤若燥而寒痛既平而實突

外淺而內橫也。陽變陰者其人多肥陰變陽者其人多瘦  
陽變陰者服涼藥之過也陰變陽者服熱藥之驟也然陽  
變陰者多死陰變陽者多生以此消息之萬不失一苟以  
氣血分陰陽或以癰爲陽疽爲陰未爲通論蓋癰疽各有  
陰陽必氣血兼補而佐之消毒始能奏功甚速倘執陽病  
是氣而不敢用補氣之藥毋論未潰之前火毒不能遽散  
卽已潰之後肌肉何能驟生單一味補血無濟于事也必  
補氣以生血則氣血兩旺氣得血而流通亦血得氣而充  
足何懼火毒之不畏散哉倘執陰病是血而不敢用補氣

之味尤爲不可摠之氣血不可失治而諸瘍必當兼用之也惟是陰陽之症不可不分知是陽症可少用金銀花化毒之品而輕佐之補血補氣之味知是陰症可多用金銀花化毒之品而重佐之補氣補血之味自然陰變爲陽而無陷滯之虞陽不變陰而有生化之妙也更有以陰陽分寒熱者殺人必多矣夫病分寒熱是人素虛之偏豈可以陽爲熱陰爲寒耶故浮洪弦數本陽脈也然陽乃氣虛而非熱沉細弱澁本陰脈也然陰乃血虛而非寒辨其陰陽而不可分爲寒熱以瘡瘍之陰陽無非正虛邪實故氣血

可以共補也

瘡瘍善惡論

瘡瘍不論大小專論善惡蓋大者有生之機小者有死之兆也惟是大小易見而善惡難知不知善惡者安知吉凶乎故善惡必須辨也大約善有五惡有七吾先言其善者起居安適無躁動之狀一善也大小便如常無諸痛苦二善也凡服藥餌隨手奏効腫易平復無膿血之多三善也神清氣爽言語响亮四善也飲食健旺易于消化口不大渴五善也有此五善雖瘡瘍形大而病實輕吉之徵也吾



再言其惡者口大渴呼飲煩躁不常腹中時痛口中時咳  
大便作瀉小便成淋此惡之一也膿少血多不腫而痛皮  
肉腐壞臭氣難聞瘡口低陷沿開廣濶此惡之二也喘粗  
氣短不足以息恍恍惚惚如見鬼祟此惡之三也黑睛緊  
小白睛青赤長多斜視上視此惡之四也手足無措神氣  
昏闇面目炭色此惡之五也見食厭惡服藥嘔吐不能飲  
食此惡之六也聲啞面腫鼻黑唇青此惡之七也有此七  
惡雖瘡瘍形小而病實重凶之徵也凶者多死吉者多生  
雖然生死何常之有往往吉變爲凶生變爲死大約皆酒

色害之也夫吉兆既可變爲凶豈凶徵獨不能變爲吉生  
兆既可變爲死豈死徵獨不可變爲生要在人善于悔悟  
而調理又得其宜亦可挽回于萬一也夫調理者慎勞絕  
慾居其半節食擇藥亦居其半也倘病人心自悔悟而藥  
餌亂投恐非轉凶起死之法大約瘡瘍惡症脈無止歇而  
有胃氣者必可救援故一現惡徵急用參芪以救之則胃  
氣不亡可變凶爲吉轉死爲生也惟是惡徵之現皆胃氣  
欲絕也吾欲使絕者不絕參芪必宜多用斷不可畏首畏  
尾而些少用之也

瘡瘍經絡論

五臟七腑各有經絡臟腑之氣血不行則臟腑之經絡卽閉塞不通而外之皮肉卽生瘡瘍矣然經絡隱皮肉之內何從知之然內有經絡外有部位部位者經絡之外應也如瘡瘍生于頭頂卽屬足太陽經之病蓋頭頂乃膀胱之部位也生于面卽屬足陽明經之病面乃胃之部位也生于頸項卽屬足厥陰經之病蓋頸項乃肝之部位也生于肋卽屬足少陽之病蓋肋乃膽之部位也生于手足心卽屬手少陰經之病蓋手足心乃心之部位也生于背爲諸

陽生于腹爲諸陰擘膈卽手之三陰三陽經之所行股脛  
卽足之三陰三陽經所屬七竅者五臟之竅也生于目乃  
肝經病也生于耳乃腎經病也生于鼻乃肺經病也生于  
舌乃心經病也生于口乃脾經病也不可據之外部位以  
知內之經絡臟腑乎雖瘡瘍因氣血之凝滯而生原無定  
位然凝滯于何經卽生于何經之部位安可不卽治于是  
經乎或曰跌仆刀傷蟲獸爪損亦能成瘡豈皆經絡之凝  
滯耶然旣傷損於是經別治他經恐難奏效何如專治是  
經之爲親切乎獨是經絡有氣血多少之異氣血多者易

于成功氣血少者難于建績又當分別之也若三焦若心經若肺經若膽經若腎經若脾經此六經皆氣多而血少非補血則未潰不能化已潰不能消也若包絡若小腸若膀胱若肝經此四經皆血多氣少非補氣則未潰不能散已潰不能生也若胃經則氣血俱多初可用消而終亦必佐之以補氣血則收功自速矣部位既明經絡無錯自然用藥得宜無憂猛浪之悞治也

### 瘡瘍內外論

瘡瘍之生內經雖言營衛之氣血不行也然而營衛之氣

血不行實有其故有外傷而氣血不行者有內傷而氣血  
不行者有不內不外之傷而氣血因之不行者亦不可不  
辨也夫外傷者傷于風寒暑濕燥火之六氣內傷者傷于  
喜怒憂思驚恐悲之七情也一有所傷則臟腑之氣血不  
從逆于肉理變生癰腫矣但天地之六氣無歲不有人身  
之七情何時不發乃有病有不病者何也蓋氣血旺而外  
邪不能感氣血衰而內正不能拒此所以六氣之傷傷于  
氣血之虧而七情之傷亦傷于氣血之乏也然而傷于外  
者輕傷于內者重輕者其勢反重重者其勢反輕疑似之

問最難辨識吾何從而辨之手吾一辨之于脈輕而反重者陽症也右手寸脈必浮大而洪數重而反輕者陰症也左手寸脈必沉實而細數吾再辨于形輕而反重者表症也其瘡口必掀突于外重而反輕者裏症也其瘡口必平陷于內似乎陽與表易治而陰與裏難治也然而瘡瘍總宜急散散之急則陽陰表裏皆能速愈也至于不內不外之傷較六氣之傷七情之傷爲少差等耳宜乎不藥有喜然而世人之氣血未必皆有餘者也况加之損殘其肌膚戕賊其肢體則已傷復傷矣吾恐損者不易續而缺者不

易全矣必須補其氣血使營衛之調和滋其臟腑俾經絡之安逸卽有毒氣自然消化于烏有矣

### 瘡瘍火毒論

瘡瘍之症皆火毒症也但火有陽火陰火之不同而毒有陰毒陽毒之各異夫旣曰火則火勢燎原救之烏可緩乎惟是陽火驟而烈陰火緩而酷夫火雖有驟緩而至于炎燒其禍則一也故救焚俱不可遲一見人生瘡瘍無論足陽是陰當速爲撲滅則隨手奏功無奈世人視爲平常因循懈怠以至輕變爲重陽變爲陰往往潰壞決裂而不可



救療或曰陽火驟似乎難遏陰火緩似乎易圖何其酷烈反勝于陽火乎蓋天下陽毒易防而陰毒難防瘡瘍火毒又何獨不然且亦知瘡瘍之火毒爲何毒乎乃龍雷之火鬱而出于木中也夫龍雷之火藏于地中天氣鬱勃火不能藏往往發越于外然而龍雷之火又藏于木中非破木焚林而火不得外泄其所出之處有焚燒屋廬者有殛死人物者苟攫其鋒多成灰炭其毒爲何如乎人之生瘡瘍者雖因氣血之不和而不和者乃氣血之鬱也五臟六腑之氣血皆能成鬱而生瘡瘍其實無不因肝腎二經之鬱

以成之也肝腎二經屬陰皆有龍雷之火火鬱之極必變  
蘊而爲毒火爲陰火則毒亦陰毒也陰毒不發則已發則  
冲擊禍害有不可勝言者此毒之所以酷烈也夫陽毒尚  
有養癰之患而陰毒尤禁養癰者以其潰壞決裂有百倍  
于陽毒也可見陰陽瘡瘍俱宜急早治之但治法不同又  
不可不分而治之也大約治陽毒之瘡瘍宜散重而補輕  
治陰毒之瘡瘍宜散輕而補重總之陰陽火毒非補則火  
不肯滅而毒不易消也但分輕重以用藥而萬不可單用  
散劑以治瘡瘍苟不辨別其陽火陰火與陽毒陰毒而止

用攻堅表邪之味吾恐火未必退而氣先失毒未必化而血先涸矣安得不天人性命哉

瘡瘍腫潰虛實論

夫瘡瘍宜分虛實未可漫然用藥也雖治瘡瘍之法俱宜用補然不知虛實益浪治之亦難速效故必審其虛實之重輕以酌量其補瀉之多少始爲上工也惟虛實何以辨之乎亦于初腫已潰時而辨之也初腫之時腫而高突焮赤作痛是陽邪毒盛病在表實也如腫而堅硬深痛亦陽邪毒盛病在裏實也表實可散裏實可攻攻散之中畧兼

用補則在表者不至入裏而在裏者必易發表矣倘腫不甚高突雖焮赤作痛而少衰此陽邪毒衰病在表虛也如腫雖堅硬痛不甚深此陽邪毒衰病在裏虛也表虛不可純散裏虛不可純攻攻散之中重于用補則表虛者力能托外裏虛者力能出內矣若已潰之後猶然腫硬焮痛發熱煩躁大便秘結瘡口堅實此陽毒未化乃邪實也尚宜補而兼散倘膿大出而反痛瘡口久而不斂發熱口乾膿水清稀腫下輒慢此陽毒已盡乃正虛也切戒散而必補以上治法猶論陽症之瘡瘍也若陰症之瘡瘍未潰

之前與已潰之後皆宜用補豈特必宜用補尤宜大補爲  
急而不可用些小之補藥也蓋陰症瘡瘍其毒最深其火  
最烈非用大補之劑則火不肯遽滅而毒不易驟消也或  
曰毒深火烈反用大補不助熱以增橫乎不知瘡瘍之火  
毒因虛而成者也不比他症之火毒得補而添其炎惟瘡  
瘍陰火愈補而愈衰瘡瘍陰毒愈補而愈化也或曰然則  
竟不消其火毒乎曰是又不然藥品之中有補味而兼攻  
者吾採而用之名爲補而仍是攻散之也又何懼哉

瘡瘍順逆論

瘡瘍最宜知者陰陽也其次宜知順逆大約陽症多順陰  
症多逆順者生逆者亡故知順逆卽知陰陽知陰陽卽知  
生死矣然而順逆不易知也其順逆之中有順而實逆有  
逆而反順此卽陽症似陰陰症似陽之說也苟不知順逆  
之真何知順逆之假乎余有辨順逆之真法如瘡瘍之初  
起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸突起腫不開散者  
順也若頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者非逆  
而何如瘡瘍之已成瘡形巖起焮痛皮薄光亮易膿易腐  
飲食知味二便調和身溫者順也若腫堅色紫不作膿不

腐潰瘡頂軟陷口乾作渴心多煩躁者非逆而何如瘡瘍  
之已潰膿稠色鮮不臭腐肉自脫焮腫易消身輕痛減者  
順也若皮爛肉堅不腐腫仍不消痛仍不減心煩臥不寧  
者非逆而何如瘡瘍之潰後膿厚稠黃新肉易生瘡口易  
斂飲食漸進無有痛楚作癢者順也若膿水清稀腐肉雖  
脫新肉不生色敗臭穢飲食不進者非逆而何倘逆而變  
順生之機也逆而不順死之兆也

何天與旨卷之二

山陰陳士鐸敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳輝初儀甫梓

會稽陶式玉尚自甫號存齋評 玄孫增方湖洄氏校

瘡瘍生死論

出生入死半是瘡瘍生死不知終難治療知其死而早爲  
謝絕固失好生之心不知生而浪爲醫治亦非起死之法  
所貴生死瞭然于胸中而後因症用藥卽或功不能成命  
不可奪亦可告無罪于病人求免禍于上帝也然而瘡瘍



生死最難分曉我舉其大槩言之陰病見陽色腮頰紅獻者死兆也陽病見陰色指甲呈青者死兆也身熱脈細唇吻反青目珠直視者死兆也面如塗脂色若黃土油膩黑氣塗抹者死兆也唇舌焦乾鼻生烟煤眼神透露者死兆也形容憔悴精神昏短身形縮小者死兆也喘粗氣短鼻掀睛露語言譫妄者死兆也循衣摸牀遺尿失禁撮空者死兆也頭低項軟眼視無神吸吸短氣者死兆也皮破無血肉綻爛斑痧木不知痛癢者死兆也齒黃色如灰齒唇白反理無紋耳黑焦枯不聽人中縮而坦平口張氣出無

同閉鼻煽相隨呼吸行汗出如珠不散痰若膠而堅凝白  
血紅如肺色指甲灣而帶青神昏神浮神亂神離縑衣生  
滿面黑氣慘天庭以上皆死兆也死症外見斷無生理於  
必死之中而求其再生之法舍人參芪朮當熟金銀花附  
子刈無筵丹也至于可生之症若何腫高勢大而易爛易  
腐此生之機也奇疼奇痛而有神氣此生之機也膿臭而  
能進食敗中而有紅肉此生之機也有生機者用補藥而  
漸能奏功無生機者用補藥而終難建續然亦有大用補  
氣補血之藥而益之化毒之品亦能奪命于瀕死又不可

委而棄之使瘡鬼泣于夜臺怨醫生之失救也

又曰癰疽別死有數症其一在伏兔其二在腓臑卽足  
肚也其三在五臟之俞穴其四在頂其五在腦其六在  
陰其七在耳之虛處其八在玉枕其九在舌本其十在  
垂膺卽喉管也此十處最忌其餘或生或死未可必也

瘡瘍嘔吐論

凡治瘡瘍皆宜顧其胃氣蓋有胃氣則死症能生無胃氣  
則輕症變重重則與死爲近矣可不急顧其胃氣乎惟是  
瘡瘍之生多傷胃氣其故何也蓋火毒侵犯之也夫火毒

視胃何以胃氣卽傷以胃乃心與包絡之子也火毒外不  
得遽發往往內攻于心而包絡爲心之相臣護衛甚力不  
許火毒之內侵未免號召五臟六腑同來救應胃乃心與  
包絡之子見君父有難奮不顧身首先勒王火毒甚熾其  
鋒難犯自然受創而敗而火毒乃舍包絡而直入于胃矣  
胃入火毒胃不自安乃上越而作嘔甚卽大吐皆火毒祛  
之也夫同是火毒之相祛何以有嘔吐之別蓋嘔者有聲  
無物乃火毒之傷胃氣也吐者有物有聲乃火毒之傷胃  
血也雖嘔吐分氣血揔之皆傷胃氣耳胃氣旣傷自宜補

胃矣然又不可純補胃也當觀其喜惡何如而佐之解毒之味則萬不失一也如嘔吐而大便閉結喜冷飲者宜降火清中喜熱飲而惡寒便利如常者宜養其胃如嘔而腸鳴腹痛作泄者宜托裏溫中如嘔吐後飲食頓進者宜大補氣血如瘡瘍未潰作嘔及惡心者乃毒氣內攻而胃氣素虛竟補胃而不必散邪如瘡瘍已潰而作嘔及惡心者或不食痞滿腸鳴腹痛大便利而作嘔及噦聲不絕不得安然宜托裏溫中是皆治嘔吐之樞機治瘡瘍者不可不細心而審問之也以上分別治法無非顧其胃氣也胃氣

安寧服藥自然奏效何患變症之生哉彼陽變陰生變死者多是損傷胃氣耳夫火毒原能傷胃况加敗毒之藥一味呆攻禁已虛而重虛乎毋怪敗壞決裂竟至于不可救已也謂非醫殺之乎是可深痛也

瘡瘍口渴論

夫口渴之症未有不是火之作祟也而瘡瘍口渴尤是火毒無疑但火有陽火陰火陽火可以外水止之而陰火不可用外水也蓋愈飲外水其渴愈甚然而瘡瘍之症口渴甚多大約陽火居其七陰火居其三陽火之口渴必不甚

以陽火之症內有陰水以濟之也若陰火口渴既無內水之滋惟有內火之燥故其渴更甚于陽火夫火非水不制何以飲外水而渴甚豈水不可以制火乎不知真水可以制邪火外水非真水也安得不加橫乎所以陽火宜用寒涼以少止其口渴陰火宜用溫補以止其口渴也而陰症陽症何以辨之大約陽症口渴者其脈必洪大而數實陰症口渴者其脈必細數即或洪大按之必無力然而不可拘也吾又辨其舌之燥滑也陽症舌必燥陰症舌必滑也燥用寒涼以瀉火滑用溫補以解毒又何疑乎然更須分

已潰未潰而治之未潰而作渴者多是火毒之盛已潰而作渴者盡是氣血之虛故未潰之前可用瀉于補之中而已潰之後但可補而不可瀉也雖古人治法止論已潰未潰皆用加減八味丸治之大效然此乃治陰癰之法也倘是陽症其中有肉桂在內吾恐反濟其火矣雖六味丸多是補水之味水足自能制火然而星星之火能燒萬頃之山萬一火盛水不足以濟之未必不轉助其焰而動其禍也是加減八味丸以治癰疽之初發尚非法之善也蓋陰症可用熱劑而陽症斷不宜遽用熱劑又在人臨症以變



通之耳

瘡瘍秘結論

瘡瘍之發發于火也火發必犯于心火即移其熱于大腸而閉結之病生矣夫心與小腸爲表裏宜移其熱于小腸何故移熱于大腸乎不知大腸雖不與心爲表裏而實與肺爲表裏也心得火毒本有不轉移于肺者也則肺即刑大腸矣況火毒最烈肺自難受自分其焰與大腸而大腸屬金最畏者火也且火又甚酷其燦金也必甚則乾燥可立而待矣或曰瘡瘍之火既分陰陽陽火宜刑大腸矣若

陰火之瘡瘍宜無犯于大腸而何以偏多閉結耶夫陰火者虛火也虛火者半出腎肝肝腎之火乃雷火也雷火最能燦水試看濃陰大雨之時一聞雷震而雲收雨止正燦水之明驗故雷火不動卽已動則引心包之火而沸騰引陽明之火而震蕩火多則水潤水潤而大腸何能潤澤乎惟是瘡瘍之陰火乃邪火也何腎肝之雷火助之乎不知邪火出于肝腎則雷火與邪火相合竟不能分孰爲邪火孰爲雷火矣但火有陰陽之分而成閉結則一治法亦可相同乎而不可同也大約陽火閉結可用攻以通之陰火

閉結可用補以潤之也陽火未潰之前於攻之中而顧其  
脫陽火已潰之後于補之內卽防其通陰火未潰之前不  
妨化毒以潤腸陰火已潰之後切戒攻毒以傷胃蓋老幼  
之虛實不等少不謹慎便至死亡烏可妄用驅逐峻利之  
藥哉

瘡瘍痛癢麻木論

經云諸痛爲實諸癢爲虛實者邪實也虛者正虛也邪實  
多是陽症正虛多是陰疴凡瘡瘍之生腫而大痛者陽邪  
之大實也腫而微痛者陽邪之差實也小痛而大癢者陽

中之陰大虛也大痛而微癢者陽中之陰少虛也大癢而  
不痛者陰大虛而無陽也微癢而不痛者陰微虛而無陽  
也更有麻疥而不知痛癢爲陰虛而不能通于陽陽虛而  
不能運于陰也論其輕重似乎痛重于癢與麻疥也而孰  
不然蓋瘡瘍最重者莫過于癢其次則在麻疥凡陰癰初  
發多起于癢人見皮膚之癢手爬搔之爲快往往癢變爲  
痛遂至敗壞決裂而不可治蓋痛乃陽毒而癢乃陰毒也  
夫同是火毒胡爲陰毒烈于陽毒大約陰癰之生半成于  
鬼祟之纏人祟憑人身未敢驟侵先以癢試之故初發之

時每每作癢及至人自爬搔鬼無所畏乃大肆其侵凌故  
大癢而轉變爲痛矣治之法宜于大癢之時卽用大補之  
藥而佐之化毒之品重劑以治之則火毒隨手而散萬不  
可待其大痛而後治之也以陰癰之生雖成于鬼祟之纏  
身然必正氣大虛邪始得而入之也設正氣不虛邪將安  
入故救大癢之陰癰必須大補氣血爲主蓋陽毒可用攻  
毒之劑而陰毒必須用補正之藥也或曰瘡瘍初起雖發  
大癢而所癢之部位不大未必皆鬼祟之纏身何必以補  
氣補血之大劑治之然古人云外大如豈內大如拳外大

如拳內大如盤未必單言背癰也吾以爲凡生瘡瘍而大  
癰者皆當作是想豈可以所癰之部位甚小而輕視之乎  
至于麻木則非大癰可比不妨緩緩治之然亦宜分已未  
潰也未潰之先而麻木者邪毒壅于經絡已潰之後而麻  
木者正氣耗于肌膚無難審量而用藥也

瘡瘍寒熱論

瘡瘍初起輕者不發寒熱重則未有不發寒熱者也但發  
熱于未潰之前者輕發熱于已潰之後者重惡寒于未潰  
之前者重惡寒于已潰之後者輕蓋火毒發越邪正交戰

陰弱則生熱陽微則惡寒似乎未潰發熱乃陰血之衰其陽氣正旺也陽旺則火毒必熾而吾以爲輕者以陽旺不至于變陰耳未潰惡寒乃陽氣之虛其陰血正勝也陰勝則瘡肉易生而吾以爲重者以陰勝必至于耗陽耳已潰發熱或疑陰變陽也誰知乃陰虛而不能濟陽乎故病重已潰惡寒或疑陽變陰也誰知是陽虛而不能濟陰乎故病輕也旣知寒熱之重輕見其寒而補其陽見其熱而補其陰何瘡瘍之難治乎然而寒熱無常有晝寒而夜熱有晝熱而夜寒有日夜惡寒而不發熱有日夜發熱而不惡

寒又將何法以治之哉嗟乎惡寒者非寒也惡熱者非熱也見其寒峻補其陽氣而不必泄其陰見其熱峻補其陰血而不必泄其陽自然熱者不熱而寒者不寒也或曰瘡瘍之生皆火毒也不消火毒而但補其陰陽母乃不可乎詎識正旺而邪自退也况補陽之味未嘗無消毒之味也補陰之品未嘗無散火之品也不則乎補氣補血之中而寓之消毒散火之劑又未爲不可耳惟是常症易治變症難治倘發熱而痛惡寒而躁又不可謂熱用補陰寒用補陽之法恐有寒盛格陽熱盛拒陰之症別當用從治之藥



寒因熱用熱因寒用之爲得也

瘡瘍辨膿血論

瘡瘍治法斷不可因循失治致養成膿往往火毒勢大爛成如盆之大而不可救療所貴于未成膿之先而急內清之也然既已成膿烏可無辨之法乎辨法奈何瘡有生熟膿有深淺多少按其瘡頭之痛與不痛軟與不軟而知之也微按之而輒痛者膿淺也大按之而痛者膿深也按之堅厚不甚熱痛者未成膿也按之軟薄而卽起者有膿也不復起者無膿也有膿可鍼無膿不可鍼也膿深者可深

刺膿淺者宜淺刺豈可一概刺乎近世外科醫工動謂火毒在內若不開刀侵潰好肉如肘膝樞紐關切之所筋骨敗壞必成廢人斷須外泄毋論可刺不可刺輕用刀鍼每有無膿之癰一開瘡口鮮血逆流立時厥去皆不審其膿之有無耳夫瘡癰有陰陽之異陽症可以刀刺陰症切戒輕易動刀蓋陽症之毒淺陰症之毒深毒淺一舉刀而毒易泄必走于外毒深一舉刀而毒難出反攻于內矣及至攻于內而爛筋壞肉則內外兩敗艱于收拾卒至死亡醫者病家皆嘆瘍癰之橫也詎知禍成于輕易之動鍼乎吾

非禁人之用刺法也刺之當則死症可以變生刺之不當則輕病必至變重余親見數人皆因刺而危幾至不救後用參芪金銀花之類大劑煎飲始得收功故引此爲戒也鐸又曰辨膿之法旣已盡知而辨血之法又不可不知也無膿而流血者皆五臟之氣不充也五臟之氣不充則陰虛而火動矣安得無血乎虛火動者必必流血當審其經以救之故肝虛而火動者血必妄行也心虛而火動者血必無主也脾虛而火動者血必難統也肺虛而火動者血必上行也腎虛而火動者血必浮遊也此

虛氣之虛火如此若六腑虛火之動何獨不然然治其  
臟而腑亦安補其臟而腑亦戢然安腑不能安臟補臟  
必能補腑故補氣卽是補血補血難以補氣蓋氣補卽  
是血補氣安卽是血安也

瘡瘍險地論

經言五臟不調致生疽六腑不和致生癰有二三日卽殺  
人者有十餘日殺人者有一月殺人者有數月殺人者蓋  
火毒輕則殺人緩火毒重則殺人急也大約殺人之瘡瘍  
皆生于險地夫癰疽之生原無定位生于平地雖大而無

危生于險地雖小而必死險地者一在腦戶一在舌本一  
在懸雍一在喉節一在胡脈一在五臟俞穴一在五臟繫  
脈一在兩乳一在心鳩尾一在兩手魚一在腸屈之間一  
在小道之後一在九孔一在兩膈腸一在神主之舍一伏  
鬼一在兩髻一在兩頤一在股肱一在兩脇一在于尻一  
在兩腋此皆至險之處也生此部位十人九死然初發之  
時急用補氣補血之味而佐之散火消毒之品亦可立時  
而愈轉禍爲祥無如世人初發之時皆不以爲急往往養  
成大患卒至于不可救也夫天下何人不以性命爲重安

于因循而失治者亦有其故蓋癰瘡發于險地者初小痛而不甚大痛無大癢而不甚小瘰或發如米粒之泡或起如疥瘡之頭其狀似微小而不足介意詎知乃至凶至惡之兆乎古人云見有小異卽須大驚正言險地之瘡瘍也吾願世人險地初生凶惡之兆忙急早治卽服補氣補血瀉火敗毒之劑未必不救然亦須懺悔絕慾始能祟去身安否則正未可知也

瘡瘍死肉論

夫瘡瘍治法無非護其生肉不至于同死也然未死之肉

可以護之不死未聞已死之內可以養之重生豈特不可  
重生且當使之速去蓋死肉不在而後生肉可長也如癰  
疽各瘍如楊梅結毒瘰癧便毒疔腫潰爛等瘡其中多有  
死肉存蝕好肉苦痛難禁以致新肉不長徒用生肌之藥  
彼此兩停不勝臭腐之侵愈加敗爛毋論斷者不可復續  
譬毒如狼虎蛇蝎豈可共處一室自然畏避之而不敢祛  
況敢和合而復聚乎無怪其久而不生肉也必瀕用刀針  
割去死肉後以生肌之散敷之助之以補氣補血之藥  
不必又用敗毒散火之湯自然死肉去而新肉易生外毒

而肉易補世人不知惟以敷貼膏藥爲神奇全不曉存  
留敗腐爲凶惡爲可嘆息也更有瘡瘍潰後不加謹慎動  
生氣惱雖死肉已無而忽長贅肉亦宜用刀割去不可謂  
是新肉而戒用刀鍼也蓋贅肉脹滿高形突其狀難觀  
倘生于面目手足之間亦甚醜態故必須去之也或疑惱  
怒不戒何便至脹生贅肉蓋怒氣傷肝肝傷必至起脾脾  
主肌肉脾傷則瘡口肉脹倘畏用刀鍼瘡口平復必有高  
突之象或用烏梅燒灰少加輕粉一上卽平且無痕跡又  
治法之巧者也